



**VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**  
**VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP**  
**DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ**  
*Agricultural Science Institute for Southern Coastal Central  
of Vietnam*

Địa chỉ: Đường Tây Sơn, KV. 8, Quy Nhơn Bắc, Gia Lai  
Điện thoại: 02563.846626 Email: asisov@mae.gov.vn  
Website: [www.asisov.org.vn](http://www.asisov.org.vn)

**BÍ ĐỎ LAI F<sub>1</sub>**  
**DƯƠNG LONG 77**



Giống bí đỏ lai F<sub>1</sub> Dương Long 77 có thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch sớm (65–70 ngày sau trồng). Khối lượng trung bình quả đạt 1,1 - 1,5 kg, dài 25 - 30 cm, đường kính 9 - 12 cm, năng suất 30 - 35 tấn/ha. Chất lượng ăn ngon, dẻo, ngọt, độ Brix đạt 10,6%. Giống có khả năng chống chịu bệnh phấn trắng (điểm 2–3) và bệnh khảm lá virus ở mức trung bình (điểm 3–5).



## KỸ THUẬT CANH TÁC

- ❖ **Thời vụ:** Giống bí đỏ lai F<sub>1</sub> Dương Long 77 có thể canh tác quanh năm tại các tỉnh phía Nam.
- ❖ **Lượng phân khuyến cáo/ha:** 150 kg N + 113 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 113 kg K<sub>2</sub>O + 5 tấn phân HCVS + 300 kg vôi bột. Bón lót toàn bộ phân hữu cơ, phân lân và vôi bột. Bón thúc lần 1: sau trồng 10-12 ngày, kết hợp vun xới lần 1 Bón thúc lần 2: sau trồng 25-30 ngày, kết hợp với vun đợt 2. Bón thúc lần 3: khi cây ra hoa và đậu quả rộ, sau trồng 35-40 ngày.
- ❖ **Mật độ trồng:** 8.000 - 10.000 cây/ha. Hàng cách hàng 2,5 m, cây cách cây 0,4 - 0,5 m.
- ❖ **Kỹ thuật chăm sóc:** Sau trồng 20 - 25 ngày tiến hành bấm ngọn để lại 3 nhánh cấp 1. Cần định cho ngọn và các nhánh hướng vào trong luống và dàn đều ngọn trên mặt luống.
- ❖ **Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh:** Áp dụng các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. Chỉ sử dụng thuốc, hóa chất có tên trong danh mục thuốc được phép sử dụng cho rau tại Việt Nam. Ưu tiên, lựa chọn các thuốc BVTV sinh học.

