



VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

*Agricultural Science Institute for Southern Coastal Central
of Vietnam*

Địa chỉ: Đường Tây Sơn, KV. 8, Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
Điện thoại: 02563.846626 Email: asisov@mae.gov.vn
Website: www.asisov.org.vn



GIỐNG DỪA XIÊM (DỪA UỐNG NƯỚC)

1. Dừa xiêm xanh

- Thời gian trồng đến cho quả: 3 - 4 năm
- Năng suất: 120 -140 quả/cây/năm
- Độ Brix: 8-10 %
- Nước: Vị ngọt thanh



2. Dừa xiêm đỏ:

- Thời gian trồng đến cho quả: 3 - 4 năm
- Năng suất: 150—180 quả/cây/năm
- Độ Brix : 8,5-9,5 %
- Ra hoa, đậu quả quanh năm



3. Dừa xiêm lửa:

- Thời gian trồng đến cho quả: 3 - 4 năm
- Năng suất: 180-200 quả/cây/năm
- Độ Brix : 7,5-8,5 %
- Ra hoa đậu quả quanh năm



KỸ THUẬT CANH TÁC

❖ **Thời vụ trồng:** Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 9-10)

❖ **Lượng phân khuyến cáo/ha:**

Lượng phân khuyến cáo thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tuổi cây (năm)	Loại phân bón (g/cây/năm)		
	U rê	Super phosphate	KCl
1	200	500	200
2	400	500	400
3	600	600	600

Lượng phân khuyến cáo thời kỳ kinh doanh (Năm thứ 4 trở đi)

Loại phân bón Liều lượng	Phân chuồng hoai	Phân đạm		Phân kali		Canxi Bo	NaCl
		N	Urê	K ₂ O	Kali clorua		
Lượng/ha/năm (kg)	22.000	92	200	192	320	200	128
Lượng/cây/năm (kg)	110	0,46	1,0	0,96	1,6	1,0	0,64

❖ **Mật độ trồng:** 204 cây/ha, cây cách cây 7m x 7m, hàng cách hàng 7m x 7m

❖ **Kỹ thuật chăm sóc:** Tưới nước đủ ẩm cho cây trong mùa khô. Thường xuyên làm cỏ xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng và sâu bệnh xâm hại. Vệ sinh cho dừa, tập trung chủ yếu vào thời kỳ sau thu hoạch, cắt bỏ các buồng dừa khô, lá già, màng dừa giữa các tàu và thân.

❖ **Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh:** Sử dụng các loại thuốc hóa học có nguồn gốc sinh học phun trực tiếp lên ngọn dừa, hoặc trộn với bột thạch cao treo định kỳ lên ngọn để phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm như bọ dừa, kiến vương, sâu đòng, bệnh đốm lá.