



VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Agricultural Science Institute for Southern Coastal Central
of Vietnam

Địa chỉ: Đường Tây Sơn, KV. 8, Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
Điện thoại: 02563.846626 Email: asisov@mae.gov.vn
Website: www.asisov.org.vn

MƯỚP ĐẮNG LAI F₁
HÀ THANH 1



Giống mướp đắng lai F₁ Hà Thanh 1 sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt với bệnh hại, nhiễm nhẹ bệnh phấn trắng, sương mai (điểm 2 - 3). Giống cho thu hoạch sau trồng từ 45 - 50 ngày. Quả dài 22 - 26 cm, vị đắng trung bình, màu xanh đậm, thịt quả cứng, chịu vận chuyển xa. Năng suất đạt từ 42 - 55 tấn/ha.



KỸ THUẬT CANH TÁC

- ❖ **Thời vụ:** Giống mướp đắng lai F₁ Hà Thanh 1 có thể canh tác quanh năm tại các tỉnh phía Nam.
- ❖ **Lượng phân khuyến cáo:** 230 kg N + 145 kg P₂O₅ + 160 kg K₂O + 15 tấn phân chuồng hoai mục + 500 kg vôi bột. Sử dụng thêm các loại phân bón qua lá để tăng cường sức sinh trưởng của cây trong lúc ra hoa kết trái.
- ❖ **Mật độ trồng:** 16.667 cây/ha. Trồng 1 hàng trên luống; hàng x hàng 1,5 m; cây x cây 0,4 m.
- ❖ **Kỹ thuật chăm sóc:** Khi cây bắt đầu xuất hiện tua cuốn thì làm giàn cho mướp đắng. Làm giàn hình chữ A hoặc U ngược cao tối thiểu 2m. Thường xuyên bắt ngọn và các nhánh bên lên giàn và điều chỉnh các ngọn và nhánh phân bố đều trên mặt giàn.
- ❖ **Phòng trừ sâu bệnh hại:** Áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. Cần sử dụng luân phiên các thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế côn trùng kháng thuốc, tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch.

