



VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
*Agricultural Science Institute for Southern Coastal Central
of Vietnam*




Địa chỉ: Tây Sơn, KV 8, Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
Điện thoại: 02563.846626 Email: asisov@mae.gov.vn
Website: www.asisov.org.vn

GIỐNG VÙNG BĐ.01

I. THÔNG TIN GIỐNG

- Giống vùng BĐ.01 có thời gian sinh trưởng từ 76 - 83 ngày.
- Giống phân cành khô, chiều cao đống quả >40 cm, phù hợp áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch.
- Quả khi chín có màu xanh vàng với 2 ngăn hạt (4 hàng hạt/quả), vỏ hạt màu vàng và khối lượng 1.000 hạt lớn (>3,0 gram).
- Chịu hạn tốt, nhiễm nhẹ bệnh đốm lá (điểm 3) và bệnh héo cây (điểm 1), chín tập trung (thời gian chín 7 - 11 ngày), không bị tách quả (điểm 1) và chống đổ ngã tốt.
- Năng suất đạt >15 tạ/ha và hàm lượng dầu đạt >53%.



II. KỸ THUẬT CANH TÁC

Biện pháp canh tác	
Thời vụ gieo trồng	-Vùng Duyên hải Nam Trung bộ: Vụ Hè Thu: gieo tháng 4 - 5 và thu hoạch tháng 7 - 8.
Kỹ thuật làm đất	- Cày sâu 25 cm, bừa lại nhiều lần cho đất nhuyễn trước khi sạ để hạt vùi dễ tiếp xúc với đất, cây mọc tốt. - Lên luống cao 20cm, rộng 1m; rãnh rộng 30cm để thoát nước.
Lượng giống gieo sạ	- Từ 4 - 6 kg/ha.
Mật độ và khoảng cách trồng	- Mật độ trồng: 30 - 40 cây/m ² , tương ứng với khoảng cách gieo: 30 cm x 10cm x 1 hạt/hốc hoặc 25cm x 10cm x 1 hạt/hốc.
Phân bón và phương thức bón phân	- Lượng phân bón đầu tư cho 1,0 ha: 5 tấn phân chuồng hoai mục (hoặc 500 kg phân HCVS) + 90 N + 90 P ₂ O ₅ + 45 K ₂ O + 300 kg vôi bột. - Cách bón: + Bón lót 100% phân chuồng, lân và vôi bột. + Bón thúc lần 1 (10 ngày sau mọc): 1/3 Urê + 1/3 Kali Clorua; + Bón thúc lần 2 (20 ngày sau mọc): 2/3 Urê + 2/3 Kali Clorua còn lại.
Chế phẩm điều hòa sinh trưởng	- Phun chế phẩm Ethephon với nồng độ 0,015% vào thời điểm cây vùi chín sinh lý (Khoảng 10 ngày trước khi thu hoạch).
Tưới nước	- Tưới 4 lần/vụ vào các thời điểm vùi bắt đầu ra hoa (25 ngày sau gieo), đậu trái (40 ngày sau gieo), vào chắt (55 ngày sau gieo) và thời kỳ bắt đầu chín (70 ngày sau gieo).
Phòng trừ sâu, bệnh hại	- Theo biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).
Thu hoạch	- Khi lá chuyển màu xanh vàng, vàng, trái gốc chuyển vàng và bắt đầu nứt, cắt cây khi trời khô ráo, ủ, phơi và ra hạt bằng máy tuốt lúa.

III. KHUYẾN CÁO PHẠM VI ÁP DỤNG

- Giống vùng ĐĐ.01 thích hợp với vùng đất thoát nước tốt, đất phù sa, đất xám,... trong điều kiện canh tác ở vụ Hè Thu (gieo tháng 4 - 5 và thu hoạch tháng 7 - 8) tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Kính chúc bà con được mùa bội thu!